

Seznam výkonů a vyšetření prováděných u všech novorozenců:

Podání vitamínu K (Kanavit) – jedná se o vitamín, který zabrání krvácení u novorozence. Podává se jednorázově, injekcí do svalu, 2 hodiny po porodu. Pokud byste dali přednost podání v kapkách, je to možné, oznamte nám to. V tomto případě se musí podávat Kanavit do 3 měsíců věku. Tento způsob podání není vhodný u novorozenců se zvýšeným rizikem krvácení.

Credeizace – kápnutí 1 kapky Ophthalmo-Septonex do obou očí, opět 2 hodiny po porodu. Zabrání rozvoji oční infekce.

První vyšetření novorozence – provádí se buď přímo na porodním sále nebo na oddělení šestinedělí, zhodnotí celkový stav novorozence, případně odchylky od normy.

Koupání novorozence po porodu – odstraní zbytky krve, smolky a jiných nečistot z pokožky dítěte, provádí se na oddělení šestinedělí. Pokud byste chtěli vykoupat miminko později, dejte nám to vědět.

Screeningová vyšetření – obecně mají za úkol vyloučit přítomnost závažnějších vad, které vyžadují sledování či léčbu již v útlém věku. Patří k nim:

- **Laboratorní screening** - provádí se k vyloučení závažných endokrinologických a metabolických onemocnění. Odebírá se kapka krve na speciální papírek, podmínkou odběru je, aby měl novorozenec alespoň 48 hodin (odběr se provádí mezi 48 – 72 hodinou). Hlásí se pouze pozitivní výsledky, jsou k dispozici obvykle do 1 týdne. Pokud se vám ani vašemu dětskému lékaři nikdo neozve, je vyšetření v pořádku. Pokud je screening pozitivní, neznamena to ještě onemocnění, ale nutnost kontrolního vyšetření. Veškeré informace pak dostanete. Jedná se většinou o vzácná onemocnění, takže riziko těchto chorob je naštěstí nízké.
- **Ortopedický screening** – vyšetření kyčlí provádí ortoped. Jedná se o screening, který vyloučí případnou nezralost kyčelních kloubů. Zhruba za další 3-4 týdny je ještě doplněn ultrazvukovým vyšetřením kyčlí. V případě podezření na nezralost kyčlí budete informována, jak o dítě pečovat, aby se nález upravil.
- **Screening sluchu** – provádí se vyšetření obou oušek speciální sondičkou napojenou na přístroj, který vyhodnotí tzv. emise. Pokud bude screening pozitivní, neznamena to, že novorozenec neslyší, ale je nutná kontrola zhruba za 1 měsíc.
- **Vyšetření závažných srdečních vad** – provádí se jednak při prvním vyšetření, kdy lékař vyšetří, zda je přítomná tepenná pulsace v tříselech a jednak před propuštěním pomocí tzv. pulzního oxymetru, kdy se měří množství kyslíku na ruce a noze pomocí sondy (vypadá trochu jako kolíček na prádlo, ale miminko netlačí). Pozitivní screening je pak indikací ke kardiologickému vyšetření.
- **Ultrazvukový screening ledvin** – vyloučí závažnější vadu ledvin, při pozitivitě je pak novorozenec sledován v nefrologické ambulanci, někdy i na dětské urologii.
- **Screening zákalu čočky (katarakta)**: Jednoduché vyšetření očí, provádí se pomocí oftalmoskopu, který znáte z oční ambulance. Při jeho pozitivitě je indikováno oční vyšetření.

Pamatujte! Pokud je screening negativní, je to v pořádku a další vyšetření není potřeba (s výjimkou ultrazvukového vyšetření kyčlí). Pokud je screening pozitivní, nemusí to znamenat závažný stav, ale je nutné dovyšetření či sledování.

Odstranění pupečníku – provádí se obvykle 2. den, pokud je pupečník zaschlý. Pokud si odstranění nepřejete, dejte nám to včas vědět a pupečník obvykle do týdne odpadne. V některých případech je pupečník ještě vlhký a je rovněž lepší jej nechat odpadnout.

Důležité:

V ojedinělých případech nemohou být některá vyšetření již v porodnici provedena (s výjimkou laboratorního screeningu, který je proveden vždy). V tom případě dostanete termín, kdy na vyšetření přijít, případně kontakt, na kterém si jej domluvíte. Na rozdíl od jiných porodnic ale většinu screeningu zvládneme v porodnici a máte pak ušetřenou cestu do nemocnice či na odbornou ambulanci.

I když se vám počet vyšetření může zdát velký, kromě laboratorního screeningu jsou všechna vyšetření neinvazivní a miminko nebolí. Ale i laboratorní screening zahrnuje odběr velmi malého množství krve a odběr je prováděn pomocí speciální lancety, která minimalizuje bolestivost. Při screeningu sluchu využíváme dobu, kdy miminko spinká, vyšetření je tak nejpřesnější.

Výsledkem uvedených postupů je skutečnost, že je v ČR jedna z nejnižších novorozeneckých úmrtností na světě!